

押してあける

## 第2類医薬品

【販売名】ツムラ漢方内服液麻黄湯

### △【使用上の注意】

#### ⊗【してはいけないこと】

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください

体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。

2. 短期間の服用にとどめ、連用しないでください

#### ■【相談すること】

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください(1)医師の治療を受けている人。(2)妊婦または妊娠していると思われる人。(3)胃腸の弱い人。(4)発汗傾向の著しい人。(5)高齢者。(6)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。(7)次の症状のある人。むくみ、排尿困難(8)次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害  
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品(箱)を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感
その他	発汗過多、全身脱力感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 1ヵ月位(感冒、鼻がぜに服用する場合には5~6回)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品(箱)を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

### 【用法・用量】

次の量を、食前または食間によく振ってから服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1本	3回
15歳未満	服用しないでください	

注)食間とは「食事と食事の間」のことで、たとえば朝食と昼食の間のことです。

食事中に服用するというではありません。

#### 〈用法・用量に関連する注意〉

(1)用法・用量を厳守してください。

(2)本剤は、本質的に沈殿を含んでいますので、服用前によく振ってから服用してください。

#### 【保管および取り扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)誤用をさけ、品質を保持するために他の容器に入れかえないでください。(4)使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。(5)ピンをあげたら飲みきってください。(6)ピンをあげたまま保存しないでください。

【包装】30mL×3本入(1日分)

発売元



お客様相談窓口

電話 0120-329-930

<http://www.tsumura.co.jp/>

製造販売元 新生薬品工業株式会社  
奈良県高市郡高取町清水谷1269

### 【効能・効果】

体力充実して、かぜのひきはじめで、さむけがして発熱、頭痛があり、せきが出て身体のふしぶしが痛く汗が出ていないものの次の諸症感冒、鼻がぜ、気管支炎、鼻づまり

### 【成分・分量】

本品1日量90mL(30mL×3本)以下、以下の生薬より抽出した麻黄湯エキス81mLを含有します。

日局マオウ……………5.0g

日局キョウニン……………5.0g

日局ケイヒ……………4.0g

日局カンゾウ……………1.5g

添加物として白糖、パラベン、香料(エタノール、グリセリン、プロピレングリコール、メントールを含む)を含有します。

副作用被害救済制度  
電話 0120-149-931