



MY MEDICAL CHART 検査結果表

〒130-8671
東京都墨田区石原
4-25-12
〇〇ビル4F
検査 太郎 様

性別 男	検査No 810003
生年月日 1971/9/27	検査受付No 20
検査報告日 2010/9/1	履歴ID 24938

ファセリア臨床検査センター

〒130-0011
東京都墨田区
石原4-25-12



検査名	検査項目	基準値	今回の結果	判定	コメント	前回の結果	前々回の結果
ピロリ菌	ヘリコバクター・ピロリ菌抗体	(-)	(+)	陽性	今回のヘリコバクターピロリ菌抗体は陽性でした。(抗体検査ですので過去の感染も含みます。) 自覚症状のある方や一度も胃の内視鏡検査を受けたことがない方はこれを機会に医療機関にご相談されることをお勧めいたします。	(-)	(+)

検体	判定方法
尿	尿中に、ヘリコバクター・ピロリ菌抗体があるかどうかを調べます。

この検査結果表についてはコチラ ファセリア臨床検査センター ☎ 0120-82-1213 (9:00- 17:15 土日祝、年末年始を除く)	健康に不安のある場合はコチラ メディカルコンシェルジュコールセンター ☎ 0120-503-577 (9:00- 18:00 土日祝、年末年始を除く)
--	---

※大腸がん、ペプシノゲン、ヘリコバクター・ピロリ菌、肝炎ウイルス、肺門部肺がん、子宮頸がん等の一部の検査結果は、数値でお知らせすることはありません。詳しい検査は、医療機関を受診してください。
※当社では、検査の精度向上、予防医学の貢献を目指し、個人のプライバシーを保護した上で皆様の貴重な検査結果を活用し、データの分析に役立てて参りたいと考えております。

■以下は参考資料です。上記検査結果とは連動しません。

? ピロリ菌に感染するとどうなるの？	<p>見逃さないで！ そのシグナル!! ●胃がもたれる ●胃が痛い ●口が臭い</p> <p>このような症状があるからといって、その全てがピロリ菌に感染しているからというわけではありません。ただし、ピロリ菌に感染していた場合、胃に何らかの炎症、及び潰瘍が出来ていることがほとんどなので、こういった症状が出る場合があります。</p> <p>治療法</p> <p>ピロリ菌の除去治療としては、投薬療法があります。現在日本では、①ランソプラゾール（胃酸分泌抑制剤）②アモキシシリン（ペニシリン系の抗生剤）③クラリスロマイシン（マクロライド系の抗生剤）の、3種類の薬を用いた除去治療が推奨されています。なお、投与期間は1週間程度です。しかし、下痢・便秘、また味覚障害・舌炎・口内炎・肝機能障害・頭痛などといった、この投薬による副作用が報告されており、胃・十二指腸潰瘍の患者における調査では、除去できなかった症例が約10%あるといったこともあるため、治療方法に関してはまだ課題があるのが現状です。</p> <p>予防策 ●大皿料理の取り分けに注意する ●部屋をきれいに保つ ●井戸水を飲まない ●検査を受ける</p>
! ピロリ菌にはどうやって感染するの？	<p>ピロリ菌は経口感染するので、感染者が家庭内にいる場合は箸や食器の共有を避け、特に幼児に対し口移しでものを与えるのはやめましょう。また、『ゴキブリがピロリ菌の運び屋になっている』ともいわれているので、常に部屋を清潔に保つ必要があります。まずは検査を受けて自分が感染しているのかどうかを確認し、感染を拡大させないことが最も重要です。</p> <p>検査のススメ</p> <p>ピロリ菌の検査には、内視鏡を飲んで調べる方法もありますが、尿で抗体を調べる簡単な方法があります。特に幼児期に感染しやすいので、小さなお子さんがいる家庭では二次的感染を防ぐためにも、自分が感染していないかを調べることをお勧めします。</p>

ヘリコバクター・ピロリ菌



大きさは2×0.45μm位の細菌でしっぽのようなものがあり、これをヘリコプターのように回転させて移動します。このことからヘリコバクター・ピロリと名付けられました。

現在ピロリ菌の感染により引き起こる病気として「胃潰瘍」「十二指腸潰瘍」が考えられています。この病気は、ピロリ菌を除去することで潰瘍の再発率が激減したことにより、その因果関係が強いと注目されています。その他には、悪性リンパ腫の一種である「胃MALTリンパ腫」や、「胃炎」、「胃ポリープ」、そして日本人に発症率の高い「胃がん」と深い関係があると言われています。胃がんに関しては今も論評が続いているものの、1994年にWHO（世界保健機構）が疫学的調査からピロリ菌を発がん物質と認定しました。